

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイルコンタクトEX ひとみリペア クール

目薬

第3類医薬品

コンタクトを長時間しているときなどの

つらい **疲れ・かすみ** に。

角膜修復成分**ビタミンA**が効く!



ひとみリペア処方

ビタミン

A

負担の
かかりがちな
角膜を修復。

涙を安定化し、
瞳に涙をとどめる。

ビタミン

B₆

栄養を補給し、
瞳の新陳代謝を促す。

ビタミン

E

血行を促進し、
瞳を健康に保つ。



うるおい角膜保護成分

コンドロイチン
硫酸エステルナトリウム

レンズとの摩擦や乾燥などによるダメージから角膜を保護する。

清涼感レベル

弱 **なし** 1 2 3 4 **5** 6 7 強

カラーコンタクトレンズをのぞく
すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

コンタクトレンズを装着されていない方もご使用いただけます。
※ソフトコンタクトレンズを装用したままでは使用できない
目薬もありますので、表示をよくお確かめください。

**防腐剤
無配合**

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を配合していません。

スマイルの独自技術により防腐効果を有しています。

→ <http://smile.lion.co.jp/pf>

ツイストキャップの開閉方法 必ずキャップを真上に向けて開閉してください。

① 開け方

容器の側面をもち
キャップをひねる



② 閉め方

音がするまで
キャップを
まっすぐ押し



容器の広い部分をもって開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。

必ず裏面もお読みください

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い |

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

● 効能

- 目の疲れ
- 目のかすみ (目やにの多いときなど)
- ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感
- 眼病予防 (水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

● 用法・用量

1日3～6回、1回1～2滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください (汚染や異物混入 (目やにやほこり等) の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用におのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分 (100mL中)

| 有効成分 | 含量 |
|-----------------------------------|----------|
| レチノールパルミチン酸エステル (ビタミンA) | 30,000単位 |
| 酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE) | 0.05g |
| ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6) | 0.04g |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 0.05g |

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、トロメタモール、等張化剤、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、L-メントール、pH調整剤を含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限 (外箱の底面に書いてあります) の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く (1～2ヶ月を目安に) ご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- (7) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。透明フィルム開封後は脱酸素剤を捨ててください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

— お問合せ先 —

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7