

押してあける



こんな症状に。「医薬品」で治す!



2つのかゆみ止め成分配合 かゆみをすばやく止める &



- 炎症を鎮める成分&血行を促進する成分配合
- 我慢できないかゆい粉ふき肌にスッと心地良い清涼感
- 塗り広げやすいローションタイプ
- 無香料、無着色

(用法・用量)

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

- 使いはじめは、図のように、キャップを手でおさえ、ノズルを持ち上げるように左方向に回しながら、上げてください。
※逆方向に回すと、ノズルが上がらないことがあります。ご注意ください。
- ノズルが上がったら、図のように、中身が出来るまで数回押してください。



(用法・用量に関する注意)

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児(15歳未満)には使用せしないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はゆるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 化粧品ではありませんので、効能で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

スムーズタッチ尿素製剤とは…

尿素は肌へ塗ったときにザラついたり、肌なじみがよくない場合がありますが、フェルゼアは、優れた技術で尿素を溶かし込んでいるため、ザラつきや肌なじみを改善しなめらかな肌ざわりで心地よくお使いいただけます。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

△ 使用上の注意

【】してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等。
(2)引っかき傷等のさずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。
(3)かざぶたの様に皮膚がはがれているところ。
(4)炎症部位(ただれ、赤く腫れているところ)。

【】相談すること

- 次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、むずり感)、はれかざぶたの様に皮膚がはがれる状態

- 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号

使用期限

かゆみに速く効く

かゆい 粉ふき肌 治療薬



乾燥による肌トラブルに
FERZEA
フェルゼア
DX20 ローション

2つの
かゆみ止め
成分
&
保水し、角質を
やわらかく戻す成分

尿素
20%
配合

なめらかな肌ざわりの
(スムーズタッチ尿素製剤)

第2類医薬品 180g

フェルゼアDX20ローション

第2類医薬品

乾燥性皮膚用薬

【効能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)
※小児(15歳未満)は使用できません。

【成分(100g中)】

尿素20.0g、ジフェニヒドラミン1.0g、リドカイン2.0g、グリチルリチン酸二カリウム0.5g、トコフェロール酢酸エステル0.5g

添加物として、ジメチルポリシリコン、1,3-ブチレン glycole、グリセリン、硬油化、ミリスチン酸イソプロピル、乳酸、水酸化Na、エドト酸Na、パラベン、メントール、ヒアルロン酸Na、カルボキシビニルポリマー、ベンタステアリン酸デカグリセリル、ステアリン酸マクロゴル、その他1成分を含有。

【保管及び取扱い上の注意】

- 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 金属(メガネ、時計、アクリセサリー等)、木材(白木、床や家具等の塗装面等)、衣類などに付着すると変質又は変色する場合があるので注意してください。

ライオン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

〔お問い合わせ先 電話:0120-813-752〕

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

MADE IN JAPAN