

第2類医薬品

# メソッド

## メソッド CLOORション

### 保管及び取扱い上の注意

- 高温および極端な低温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 火気に近づけないでください。
- 本剤はアルコール類を含むため、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、プラスチック製品、化繊製品、皮革製品、床、家具などにつかないように注意してください(変質する場合があります。)

- 使用期限(箱底面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- 液もれを防ぐためキャップをしっかり閉めてください。
- 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- 使用後はボトルの口元を拭いてください。

火気厳禁 第二石油類(エタノール)  
水溶性 危険等級Ⅲ

## ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先 電話:0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

Antipruritic  
and Anti-inflammatory  
Drugs



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

かゆい「部位」に効く 頭皮などのかゆみ・湿疹に  
メソッド CLOORション 50mL

<鎮痒消炎薬>

〈こんな症状に・こんな方に〉



非ステロイド

第2類医薬品

MADE IN JAPAN

### メソッド CLOORションの特長

4つの作用で、かゆみ・湿疹に「効く」治療薬

かゆみを  
すばやく止める  
●ジフェンヒドラミン  
●リドカイン  
●l-メントール

炎症を鎮め、  
赤みやツブツを抑える  
●グリチルリチン酸  
ニカリウム

患部を殺菌する  
●イソプロピル  
メチルフェノール

血行を促進し、  
患部の修復を助ける  
●トコフェロール酢酸  
エステル

●スースと爽やかな使用感 ●垂れにくく、べたつかない透明ローション ●無香料、無着色

効能 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、ただれ、虫さされ、じんましん、しもやけ 0320 **LION**

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

容器の先端を患部につけて塗布します。使いやすいポルタリブ



頭皮に使用する場合は、症状のある部分に、右図のように髪の毛の流れに沿って塗布した後、指でなじませてください。



(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。

成分(1g中) ジフェンヒドラミン10mg、リドカイン20mg、l-メントール5mg、グリチルリチン酸ニカリウム10mg、イソプロピルメチルフェノール1mg、トコフェロール酢酸エステル5mg 添加物:グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セチル硫酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、エタノール、パラベン、その他2成分

### ⚠️ 使用上の注意

#### ⚠️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください